



Problemas de bienestar de las conejas reproductoras

Bienestar físico

Problema de bienestar	Problema	Solución
Confinamiento físico en jaulas	Falta de espacio para el ejercicio y los comportamientos naturales Falta de altura para incorporarse sobre las patas traseras	Utilizar sistemas de corral en interior o al aire libre sin restricción de altura. Proporcionar suficiente espacio horizontal (al menos 4500 cm ² por conejo) y vertical (sin restricción de altura).
Falta de fibra en la dieta	Mala salud dental y mal funcionamiento intestinal	Proporcionar acceso permanente a heno, hierba o plantas leguminosas como la alfalfa. Estos alimentos pueden proporcionarse esparcidos o en una rejilla o tubo comprimido.
Poco confort físico	Suelos de alambre	Alojar a los conejos en suelos que no sean de alambre. Podría utilizarse un suelo de listones de plástico, goma o bambú, o cama de paja sobre suelo sólido (lo cual requiere un reabastecimiento frecuente para prevenir enfermedades).
Poco confort físico	Estrés por calor	Garantizar que los sistemas de ventilación mantengan la temperatura en la zona de confort térmico de los conejos (<25°) y que los conejos dispongan de espacio suficiente para bajar la temperatura (por ejemplo, estando tumbados) en climas cálidos.

Problema de bienestar	Problema	Solución
Altas tasas de reemplazo	Las causas principales son la infertilidad y la mastitis, y las enfermedades entéricas y respiratorias	Proporcionar un ambiente higiénico y bien ventilado
Altos índices de enfermedades	Falta de higiene, enfermedades como la coccidiosis y la pasteurelosis, enfermedades respiratorias e infecciones parasitarias o fúngicas	Proporcionar un entorno higiénico y bien ventilado que se limpie a fondo entre lotes. La coccidiosis puede ser prevenida con el uso de coccidiostáticos.
Lesiones	Lesiones del corvejón Pododermatitis Lesiones por agresión	Alojar a las conejas reproductoras en suelos que no sean de alambre. Las hembras alojadas en grupo corren el riesgo de sufrir agresiones. Deben disponer de mucho espacio y los problemas de agresividad deben vigilarse atentamente.
Mortalidad de los gazapos	Crías muertas por otras conejas madres	Las hembras deben tener cajas nido individuales durante el parto y la lactancia temprana.